



Se dopo l'assunzione di cocaina vieni colto da malori chiama il 118, soprattutto se hai sintomi psichici (sensazione di morte imminente, paranoie e allucinazioni) o fisici (sensazioni di svenimento, incapacità di stare in piedi, tremori, forti dolori in testa, dolori al petto, alla schiena, al braccio o al collo). Se ti trovi ad una festa ed è presente l'Unità Mobile di Riduzione dei Rischi o servizi simili chiedi aiuto agli operatori.

Mix


- **Coca + Stimolanti o alcol:** il mix può facilmente rendere aggressivi.
- **Coca + Alcol:** agiscono su cuore e fegato aumentando i rischi di aritmia e di infarto, rinforzando notevolmente la dipendenza dalle due sostanze.
- **Coca + Keta:** agiscono in modi opposti sull'organismo e possono provocare dissociazioni psichiche, convulsioni, aritmie e collassi gravi anche a bassi dosaggi.

Informazioni legali

Se la tua professione rientra in quelle cosiddette "a rischio" cioè che possono recare danni a terzi, puoi essere sottoposto in qualsiasi momento a test antidroga e antialcol. Se vieni trovato positivo puoi essere sottoposto a misura restrittiva, sospensione della mansione fino alla perdita del lavoro. La polizia può effettuare il test della saliva se ha il sospetto di consumo di stupefacenti, se risulti positivo alla guida viene applicata la pena massima che arriva fino a 6000 euro di multa, 2 anni di sospensione patente e 1 anno di arresto. La cocaina lascia tracce nel sangue fino a 24 ore (fino a 2/3 giorni per i metaboliti). Nelle urine invece rimane dai 2 ai 4 giorni. Più i capelli sono lunghi più le tracce sono rinvenibili nel tempo: con i capelli lunghi 12 cm si può risalire al consumo di un anno prima.



co
cai
na



cocaina → coca, coke, svelta, botta, striscia, pezzo, pippotto, bonza, bamba, neve, bianca, polvere d'angelo, barella, freebase, crack, piscia di gatto



La sostanza

La cocaina è uno stimolante che agisce direttamente sul sistema nervoso, può essere di origine vegetale (estratta dalle foglie della coca) o sintetica (prodotta a partire da sostanze di sintesi).

Modalità di assunzione

Inalazione; aspirazione dei vapori (stagnola); aspirazione dei fumi di Freebase (sostanza mischiata con ammoniaca) o di Crack (sostanza mischiata con bicarbonato di sodio); iniezione endovenosa.



Quantitativi

In genere, nei campioni di cocaina analizzati, il contenuto di sostanza attiva si aggira attorno al 50% (min 30% max 80%): senza un'analisi chimica della sostanza è quindi impossibile stabilire esattamente cosa c'è nella polvere e in quali quantità. La dose media va dai 50 ai 100 mg. Nel caso di un consumo prolungato, si può arrivare fino a 300 mg. Se fumata da 50 a 350 mg. Se iniettata tra 70 e 150 mg.

Effetti

Inizio degli effetti: dopo 2/3 minuti se sniffata; dopo qualche secondo se fumata o iniettata.

Durata degli effetti: 30/90 minuti se sniffata; 5/20 minuti se fumata o iniettata. La cocaina aumenta la concentrazione di dopamina sintetizzata dall'organismo nel cervello. Gli effetti possono essere: il potenziamento dell'Ego; aumento della fiducia in se stessi; sentimento di

onnipotenza; restringimento dei vasi sanguigni; accelerazione del ritmo cardiaco e aumento della pressione sanguigna; scomparsa degli stimoli della fame e della sete.

Rischi

Si possono verificare: iperattività; perdita dell'inibizione; agitazione; bisogno di parlare; tendenza ad esporsi a rischi; riduzione della capacità di giudizio e critica. Nella fase della discesa si può accusare pesantezza, depressione, ipersensibilità, stati d'ansia e voglia di un'altra dose.

ATTENZIONE !

- La cocaina sviluppa dipendenza: la prima volta prendi al massimo la metà della dose che prendono gli abituarini, mantieni basso il dosaggio ed evita di consumarne di frequente.
- Se poco dopo la sniffata denti, labbra o naso si anestetizzano è probabile si tratti di anestetici locali di sintesi con effetti rischiosi e imprevedibili.
- Non usare cocaina se soffri di epilessia, ipertensione, asma o turbe psichiche.
- Fumare Crack o Freebase e iniettare la sostanza comporta più rischi.
- Se la sniffi, usa la tua cannucchia per evitare la trasmissione dell'epatite.
- La cocaina disinibisce, ma non riduce i rischi di contrarre infezioni sessualmente trasmissibili. Usa il preservativo; ricorda che la cocaina può aumentare il desiderio sessuale, ma anche interferire con l'erezione e l'orgasmo.
- Nelle donne la cocaina può influire sia sul ciclo mestruale che sullo sviluppo del feto in caso di gravidanza.