

Mix

- **Coca + Stimolanti o alcol:** il mix può facilmente rendere aggressivi.
- **Coca + Alcol:** agiscono su cuore e fegato aumentando i rischi di aritmia e di infarto, rinforzando notevolmente la dipendenza dalle due sostanze.
- **Coca + Keta:** agiscono in modi opposti sull'organismo e possono provocare dissociazioni psichiche, convulsioni, aritmie e collassi gravi anche a bassi dosaggi.


Informazioni legali

Se la tua professione rientra in quelle cosiddette "a rischio" cioè che possono recare danni a terzi, puoi essere sottopost* in qualsiasi momento a test antidroga e antialcol. Se vieni trovat* positiv* puoi essere sottopost* a misura restrittiva, sospensione della mansione fino alla perdita del lavoro. La polizia può effettuare il test della saliva se ha il sospetto di consumo di stupefacenti, se risultati positiv* alla guida viene applicata la pena massima che arriva fino a 6000 euro di multa, 2 anni di sospensione patente e 1 anno di arresto. La cocaina lascia tracce nel sangue fino a 24 ore (fino a 2/3 giorni per i metaboliti). Nelle urine invece rimane dai 2 ai 4 giorni. Più i capelli sono lunghi più le tracce sono rinvenibili nel tempo: con i capelli lunghi 12 cm si può risalire al consumo di un anno prima. Hai diritto a ricevere informazioni sui motivi di eventuali test. La polizia deve avere un fondato sospetto per richiederli.

Durante l'effetto di sostanze la percezione e la lucidità possono essere alterate, anche rispetto al consenso. Per questo è importante che ogni tipo di attività sessuale e relazionale avvenga solo quando tutte le persone coinvolte sono consapevoli e in grado di esprimere un consenso libero e informato.



co
cai
na




art: francesco gamberoni



La sostanza

La cocaina è uno stimolante che agisce direttamente sul sistema nervoso, può essere di origine vegetale (estratta dalle foglie della coca) o sintetica (prodotta a partire da sostanze di sintesi).




Modalità di assunzione

Inalazione; aspirazione dei vapori (stagnola); aspirazione dei fumi di Freebase (sostanza mischiata con ammoniaca) o di Crack (sostanza mischiata con bicarbonato di sodio); iniezione endovenosa.

Dosaggi

In genere, nei campioni di cocaina analizzati, il contenuto di sostanza attiva si aggira attorno al 50% (min 30% max 80%): senza un'analisi chimica della sostanza è quindi impossibile stabilire esattamente cosa c'è nella polvere e in quali quantità. La dose media va dai 50 ai 100 mg. Nel caso di un consumo prolungato, si può arrivare fino a 300 mg. Se fumata da 50 a 350 mg. Se iniettata tra 70 e 150 mg.



Effetti

Inizio degli effetti: dopo 2/3 minuti se sniffata; dopo qualche secondo se fumata o iniettata.

Durata degli effetti: 30/90 minuti se sniffata; 5/20 minuti se fumata o iniettata.

La cocaina aumenta la concentrazione di dopamina sintetizzata dall'organismo nel cervello. Gli effetti possono essere: il potenziamento dell'Ego; aumento della fiducia in se stessi; sentimento di onnipotenza; restringimento dei vasi sanguigni; accelerazione del ritmo cardiaco e aumento della pressione sanguigna; scomparsa degli stimoli della fame e della sete.

Rischi

Si possono verificare: iperattività; perdita dell'inibizione; agitazione;

bisogno di parlare; tendenza ad esporsi a rischi; riduzione della capacità di giudizio e critica. Nella fase della discesa si può accusare pesantezza, depressione, ipersensibilità, stati d'ansia e voglia di un'altra dose.

ATTENZIONE !

→ La cocaina sviluppa dipendenza: la prima volta prendi al massimo la metà della dose che prendono gli abituarini, mantieni basso il dosaggio ed evita di consumarne di frequente.

→ Se poco dopo la sniffata denti, labbra o naso si anestetizzano è probabile si tratti di anestetici locali di sintesi con effetti rischiosi e imprevedibili.

→ Non usare cocaina se soffri di epilessia, ipertensione, asma o turbe psichiche.

→ Fumare Crack o Freebase e iniettare la sostanza comporta più rischi.

→ Se la sniffi, usa la tua cannucchia per evitare la trasmissione dell'epatite.

→ La cocaina disinibisce, ma non riduce i rischi di contrarre infezioni sessualmente trasmissibili. Usa il preservativo; ricorda che la cocaina può aumentare il desiderio sessuale, ma anche interferire con l'erezione e l'orgasmo.

→ Nelle donne la cocaina può influire sia sul ciclo mestruale che sullo sviluppo del feto in caso di gravidanza.

Se dopo l'assunzione di cocaina vieni colt* da malori chiama il 112, soprattutto se hai sintomi psichici (sensazione di morte imminente, paranoie e allucinazioni) o fisici (sensazioni di svenimento, incapacità di stare in piedi, tremori, forti dolori in testa, dolori al petto, alla schiena, al braccio o al collo). Se ti trovi ad una festa ed è presente l'Unità Mobile di Riduzione dei Rischi o servizi simili chiedi aiuto.